


# 「鼻に注入するワクチン」と 「注射のワクチン」の比較表

	鼻に注入するワクチン（フルミスト）	注射のワクチン
ワクチンの特徴	<p>生きているインフルエンザウイルスを鼻に注入します（<b>生ワクチン</b>）。</p> <p>※接種後1週間程度は鼻やのどでワクチンウイルスが繁殖します。ウイルスは弱毒化されているので、ひどい症状にはなりません。軽い咳・鼻水・のどの痛み・熱が一時的に見られる場合があります。</p>	<p>死んでいるインフルエンザウイルスの一部を腕に注射します（<b>不活化ワクチン</b>）。</p>
対象年齢	<b>2歳～18歳</b> （これ以外の年齢は不可）	生後6か月以上
接種回数	<b>1回のみ</b>	原則12歳までは2回、13歳以上は1回
値段	9000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2歳以下は1回4000円（2回で8000円）</li> <li>・3歳以上は1回4500円（2回で9000円）</li> </ul>
有効性	「現時点での研究報告では両者の有効性（発病の予防率等）に明らかな差はない」と国は評価している。	
効果の始まり	接種後2週間から	
効果の持続	<b>接種後1年間程度</b>	<b>接種後5か月間程度</b>
接種できない人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・過去に本剤の成分でアナフィラキシーを呈した人。<b>ゼラチンアレルギー</b>。</li> <li>・<b>免疫不全状態</b>（免疫抑制剤を使用中か中止後6か月以内。先天性、後天性疾患、無脾症など）。ワクチン株で発病する可能性がある。</li> <li>・<b>妊娠中</b>。</li> <li>・<b>接種後2週間はワクチンウイルスを感染させる可能性（0.6%）があるので、身近に乳児、免疫が弱い人、基礎疾患がある高齢者など、インフルエンザを感染させたくない人がいる場合は接種を控える。</b></li> <li>・<b>喘息の治療中</b>、または過去に重度の呼吸困難で入院、または接種時に喘鳴あり。</li> <li>・<b>ミトコンドリア脳筋症</b>。</li> <li>・中枢神経系の解剖学的バリアー破綻がある人（<b>人工内耳、内耳の先天奇形、髄液漏など</b>）※安全性が未検討。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・過去に本剤の成分でアナフィラキシーを呈した人。</li> </ul>

<p>特殊な注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フルミスト接種前48時間～接種後2週間にタミフル・リレンザ等のインフルエンザ治療薬を使用するとフルミストの効果が減弱する可能性があります。※接種前5日以内のラピアクタ、17日以内のゾフルーザも減弱する可能性あり。</li> <li>・フルミスト接種後の2週間はインフルエンザ抗原検査が陽性になる可能性がある。</li> <li>・フルミスト接種後の4週間はアスピリン、ボルタレン、ポンタールは使用しない。ライ症候群、インフルエンザ脳症のリスクが増えるため。</li> <li>・妊娠の可能性がある女性は、あらかじめ約1か月間避妊した後に接種し、接種後2か月間は避妊すること。</li> </ul>	
<p>接種時の苦痛</p>	<p><b>鼻に注入する際の違和感のみ（痛みなし）</b></p>	<p><b>注射時の痛み</b></p>
<p>重大な副反応</p>	<p>副反応について両者を比較した国内の研究はないが、両者ともに重大な副反応（ショック・アナフィラキシー等）は稀である。</p>	
<p>その他の副反応</p>	<p><b>接種後2～8日に軽い熱・咳・鼻汁・頭痛・のどの痛み・倦怠感など（インフルエンザ症状）が出る場合がある。</b></p>	<p><b>接種後数日間の接種部位の腫れ・痛み、熱など。</b></p>
<p>他のワクチンとの同時接種</p>	<p>可</p>	<p>可</p>
<p>注射の生ワクチンとの接種間隔</p>	<p>4週</p>	<p>不問</p>
<p>授乳中の接種</p>	<p>母乳に害はないが、授乳時の母児の接触でワクチンウイルスを母から児に感染させる可能性がある。</p>	<p>可</p>
<p>卵アレルギー</p>	<p>可</p>	<p>可</p>
<p>その他の留意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点鼻直後にくしゃみをしたり、液が鼻から垂れてきても効果に問題はありません。</li> <li>・液を飲みこんでも問題ありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・妊娠中はどの時期でも接種可。</li> </ul>